

De Prei ofwel de plant Allium Porrum

INHOUDOPGAVEN

*ALGEMENEN INFO OVER DE PLANT

*TEELTWIJZEN

*RASSEN

*BODEM / BEMESTING

*ZAAIEN / OPK WEEK

-het zaaimoment

-Zaaien, kiemen, spenen en uitplanten

-Verzorging na het uitplanten

-Opsomming van de mogelijke problemen

*OOGST

ALGEMENEN INFO OVER DE PLANT

Prei is een aromatische, pittige groente. De wetenschappelijke naam is *Allium porrum*. De hoger taxon (categorie in de biologie) is look.

Look (*Allium*) is een plantengeslacht uit de narcisfamilie (*Amaryllidaceae*) met wereldwijd bijna 700 soorten. Het zijn meerjarige bolgewassen, variërend in hoogte van 10 cm tot 1,5 m. In APG III was dit nog de lookfamilie (*Alliaceae*), maar deze werd in APG IV samengevoegd met de narcisfamilie.

Prei behoort tot dezelfde (Lelie-)familie als uien en knoflook maar hier wordt geen bol/knol gevormd om de voedselreserve in op te slaan. Prei is geen wortelgewas. Prei bestaat uit compact **samengepakte bladeren** die deels groen en deels witgekleurd zijn. Het onderste gedeelte van prei is wit omdat het zich ondergronds bevindt. Omdat een deel van de prei onder de grond zit, zou je misschien denken dat het een wortelgewas is. Het ondergrondse deel bestaat echter niet uit een wortel maar ook uit samengepakte bladeren. Kortom, prei is eigenlijk een **bladgewas**, al zou je dat misschien op het eerste gezicht niet denken.

Prei kan goed tegen koude en wordt dan ook veel naar het najaar geteeld. We onderscheiden zomerprei, herfstprei en winterprei. Winterprei is steviger en dikker dan zomerprei.

Van de Grieken en Romeinen is bekend dat zij al 2100 jaar voor Christus prei aten. Van daaruit is deze groente verder doorgevoerd Europa in. De groente komt zelfs voor in het nationale embleem van Wales. In Nederland wordt prei voornamelijk geteeld in Noord-Brabant en Limburg. Prei is een tweejarig ras. Als je prei in het eerste jaar laat staan, zal de plant in het tweede jaar gaan bloeien. Hoewel de bloemen van prei erg decoratief zijn, is het voor de smaak van de prei beter om de planten in het eerste jaar te oogsten.

De groeicyclus van prei is 200-255 dagen.

TEELTWIJZEN

Er zijn 2 groepen.

zomer- en vroege herfstteelt:

Zomerprei: om reeds vanaf eind juni/ begin juli prei te oogsten moet je al in januari of februari zaaien onder glas. Uitplanten in april

Herfstprei: (vroeg) in maart zaaien en uitplanten begin juni (late) in april zaaien en uitplanten in tweede helft van juni.

Deze prei is niet zo goed winterhard als winterprei, hoewel ze zeker wel wat vorst kan verdragen hoor. Het blad is grijsgroen, ze groeit snel bij warme temperaturen.

late herfst- en winterteelt:

Winterprei: uitzaaien in april en uitplanten in juni/juli.

Deze prei groeit dus langzamer, heeft ook een wat meer gedrongen uiterlijk (korter, steviger), groeit beter bij lagere temperaturen, kan zeer goed tegen vorst. Deze prei kan tot en met maart na het jaar van uitplanten in de tuin blijven staan. In april (ook afhankelijk van het ras en het weer) zal de prei dan door gaan schieten.

Als je zelf niet wil zaaien kan je steeds plantgoed van prei kopen.

Het zaad is ook verkrijgbaar in gepilleerde vorm (onthuld zaad).

Houd een vruchtwisseling van 1 op 4 jaar aan. En bedenk dat prei zoveel voeding gebruikt dat ze de grond behoorlijk 'arm' achter laat: bemest dus voldoende bij of teel het jaar erop bijvoorbeeld bonen of worteltjes (die houden van goede structuur maar hebben niet veel voedingsstoffen nodig).

Je mag prei gerust telen op grond waar eerder koolgewassen, wortelen, spinazie, erwten en bonen hebben gestaan.

Prei mag je planten waar ook tegelijkertijd in de nabijheid tomaten, sla, of andijvie, zijn geplant, maar NIET met in de nabijheid van aardappelen, knolvenkel, bonen of erwten.

Het wordt afgeraden om te zaaien op een plek waar eerder andere looksoorten hebben gestaan.

RASSEN

Enkele bijzondere rassen en hun eigenschappen:

De preirassen worden ingedeeld in twee grote groepen. De eerste groep zijn de herfstrassen en de tweede groep zijn de winterrassen. Verschillende zaadfirma's verdelen de herfstrassen dan nog eens in herfstreuzen en Zwitserse reuzen. De winterrassen worden verdeeld in winterreuzen en blauwgroene-winter.

a. herfstrassen (groep 1)

Deze hebben meestal een donkergroene tot grijsgroene bladkleur. Ze zijn snelgroeïend en hebben een lange schacht. Ze bezitten een vrij zachte bladstructuur waardoor in rijpe toestand vrij vlug slijtage optreedt.

De meeste herfstrassen zijn zeer vorstgevoelig:

b. winterrassen (groep 2)

De bladkleur van deze rassen is blauwgroen. De winterrassen kunnen enige vorst gemakkelijk verdragen en zullen bij lagere temperaturen en een zwakkere luchtintensiteit nog een voortreffelijke groei vertonen. De schacht is kort, maar zeer stevig.

De hele winter zullen ze qua kwaliteit en qua uiterlijk intact blijven:

Elbeuf	Een zware vlotte groeier. De bladeren zijn breed maar de kleur is flets en dus niet goed. Dit ras wordt vooral als zomerteelt gebruikt. Het is de vroegste soort maar is sterk vorstgevoelig.
Lincoln 	Bulgaarse Reuzen, voor talloze liefhebbers van dit ras betekent Lincoln een grote verbetering. Is donker van kleur en groeit nog forser uit. Bezit de kenmerkende goede

	smaak van Bulgaarse Reuzenprei. Deze zomerprei verdraagt lichte vorst.
Snowstar	Een vrij snelgroeierende herfstreuzenselectie. Geeft lange witte en dikke schachten. Bijna geen knobbelvorming en het blad is donkergroen van kleur.
Rami	Zware zomer- en herfstprei geschikt voor oogst vanaf mei tot laat in het najaar. Donkergroene bladkleur. Lange zware schacht zonder knobbel, zeer uniforme prei met mooie presentatie.
Goliath	Grijsgroen gekleurd blad, een brede dikke stam en praktisch geen knobbel. Een bijzonder snelle groei en geeft een lange harde witte schacht. Verdraagt matige vorst.
Tara	Deze prachtige zomer- en herfstprei mag aanzien worden als de absolute topper voor vroeg oogstbare prei. Diepblauwgroene



	bladkleur met een opgerichte bladstand. Bij voldoende diep planten, lange witte schacht van 18 à 22 cm, weinig knobbel. Zeer sterk tegen sleet door de solide waslaag. Is bovendien sterk ziektebestand.
Bleuветia	Zeer vroeg en bijzonder geschikt voor de zomerteelt en de vroegste herfstteelt. Dit ras is slijtvast en weinig gevoelig voor het geelstreepvirus
Upton F1 	Herfst- en vroege winterprei. Snelle groei, mooi groene bladkleur, opgerichte bladstand en een lange witte schacht zijn de troeven. Zowel het plantmateriaal als het volgroeide product zijn zéér uniform, zodat er ook met minder zaden toch meer bruikbare planten zijn.
Electra	Een brede bladwaaier en een blauwgroene kleur.
Piket	Weinig last van ziekte. Snelle groeier maar zeer lange,

	tamelijk dikke schacht zonder knobbel.
Jolant	Zomerprei, behoord tot de Zwitserse reuzen, snelgroeiend met lange schacht. Zaaien december- februari onder glas. Oogstbaar juni tot september.

Van Luik	Een lang, breed donker blauwgroen blad en een lange dikke zeer vaste schacht zonder knobbel.
Kenton F1 	Winterprei, voor oogst vanaf november tot laat in het voorjaar. Sterk koudebestand met donkergroene rechtopstaande bladstand en lange witte schacht. Buitengewoon uniforme zware en mooi gevormde stengels. Kenton F1 combineert een hoge productie aan uniforme kwaliteit en goede weerstand tegen plantenziekten.
Parton F1 	Late herfst- en winterprei. Diepgroene bladkleur, zware stengel en een sterk opgerichte bladstand zijn de belangrijkste kenmerken. De mooie uniforme kwaliteit is opmerkelijk. Sterke winterharde prei van de nieuwe generatie die een hoge opbrengst garandeert. Een goede weerstand tegen ziekten is bij dit ras ingebouwd.

Acadia	Zeer sterk tegen verschillende ziekten. Het blad, is breed en donker blauwgroen. De schacht is lang zeer dik, vertoont weinig knobbel. Boven de grond vormt dit ras nog een lang "handvat" waardoor dit ras gemakkelijk te oogsten is.
Vrisio 	Supersterke winterprei, aanbevolen voor de oogst in de late herfst, winter en voor extreem late oogst tot in het voorjaar. Weerstaat strenge vorst en slechte weersomstandigheden. Een uitzonderlijk uniforme variëteit met diepdonkergroene bladkleur. Is buitengewoon sterk tegen slijtage. De stengel is lang en zeer vast, met korte overgangskleur wit-groen. Vertoont zeer weinig knobbel.
Kajak RZ	Zeer lange houdbaarheid. Oogstbaar van oktober tot april. Lange harde witte schacht en een donker blauw-groene bladkleur. Sterk tegen virus en bladvlekken.

Farinto 	Voor de late herfst- en winterteelt. Vormt zware, dikke preien. Farinto ontwikkelt zich na de winter, doorstaat hevige kou en groeit dadelijk na de vorst, in het vroege voorjaar uit tot dikke prei.
Castelstar	Een prima wintervastheid. Een donkergroene bladkleur maar tamelijk korte schacht. De productie is daardoor matig.
Forrest 	Zware winterprei geschikt voor de oogst tot diep in het voorjaar. Opstaand gewas met diepblauwgroene bladkleur. Sterk winterhard met een goede weerstand tegen bladziekte en roest.

Oerprei (*Allium ampeloprasum*) is een hele andere soort. Het is een heel oude groente die in ongebruik is geraakt. Oerprei heeft bolletjes en groeit als knoflook. De bolletjes worden geplant in het najaar (september). Ze lopen meteen uit, overleven de winter, en groeien in het voorjaar uit tot preitjes met dunnen stelen. In de zomer rijpen ze al en vormen dan weer nieuwe bolletjes. Het is eenvoudig te telen en wat robuuster dan de traditionele prei.

BODEM / BEMESTING

Bij prei is het onderdeel bodem en bemesting één van de belangrijkste factoren of je oogst wel of niet slaagt. Preiplanten stellen namelijk best wat eisen aan de grond. Prei houdt van een vruchtbare vochtige bodem, en kan ook goed grote hoeveelheden stalmest verdragen. Prei houdt van een rijke bodem, vochthoudend maar toch luchtig en een goede structuur. Ze heeft veel voeding nodig, vooral stikstof (voor bladgroei), maar pas op met overbemesten. Naast de algemene voorbereiding van het onderspitten van oude stalmest geven we een week of 3 voor het planten wat bloedmeel of een andere stikstofrijke organische meststof. Gebruik koemestkorrel of rijke compost als we geen stalmest hebben. Vaak zal het nodig zijn om ook tijdens het groeiseizoen nog een keer te bemesten.

ZAAIEN / OPK WEEK

-het zaaimoment

Prei kun je dus bijna het hele jaar door planten en oogsten. Zo heb je de zomerteelt, de late zomerteelt, de vroege en late herfstteelt, en de winterteelt. Wil je in de zomer oogsten? Begin dan vanaf half januari met zaaien. Kies je voor de herfstteelt, zaai dan eind maart. En voor een winteroogst zaai je vanaf april.

	Teelt	Jan			Feb			Mrt			Apr			Mei			Jun			Jul			Aug			Sep			Okt			Nov			Dec			Afstand
		B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	in cm						
Prei	Zomer																																25 x 10					
	Vroege herfst																																40 x 15					
	Late herfst																																40 x 15					
	Winter																																40 x 15					
	Zaai binnen																																					
		Zaai onder glas			Zaai buiten			Plant onder glas			Plant buiten			Oogst																								
	B - Begin van de maand	/			M—Midden van de maand			/			E - Einde van de maand																											

-Zaaien, kiemen, spenen en uitplanten

Voorzaaien en zaaien in de volle grond

*Preizaadjes zijn erg klein, zwart van kleur en hebben een vrij onregelmatige vorm. Na het zaaien, groeit prei uit tot een heel slank groen steeltje. Dit steeltje wordt geleidelijk dikker en ondergronds ontwikkelt zich een wortelstelsel. Bij het oogsten van prei kan je goed zien dat prei talloze witkleurige wortels heeft. Tijdens de groei verkorten de wortels zich, waardoor de gehele plant als het ware een stukje de grond in wordt getrokken.

*Voor een snelle ontkieming van de zaden, kunnen ze 24 uur voor het zaaien, geweekt worden in wat lauwwarm water. Hierna kunnen ze gewoon worden gezaaid.

*In januari/februari (zomerprei) zaai je in onder glas of kas in bakken/kweekpotten op 1 cm diepte. Tijdens de opkweekperiode houd je de grond goed vochtig. Zaai in rijen met 15cm tussenafstand. Leg de zaden niet te dicht naast elkaar zodat je weinig of niet moet uitdunnen. Voor het voorzaaien in een kweekbak gebruik dan een mengsel van 4/5e deel potgrond en 1/5e deel brekerzand en/of vermiculiet. Dat mengsel verdeel je tot de rand in een hoge plastic bak/kweekpot (uiteraard met onderin gaatjes gemaakt voor de afwatering). Preizaden zaaien, afdekken met een laagje grond/zandmengsel, water geven en in de kas houden tot de zaden kiemen. Of eventueel de eerste tijd binnenshuis maar dan wel zo koel en licht mogelijk.

Bedenk dat de groei langzaam gaat en dat de zaailingen tot in mei in de pot, bak of volle grond zullen staan. Goed nat houden, dan kiemen de zaden binnen ongeveer 3 weken (afhankelijk van de temperatuur).



Gekiemde preizaden

Je kunt de zaden ook bij geconditioneerde temperatuur laten ontkiemen. De ideale **kiemtemperatuur van prei is 18 - 20 °C**. Houd deze kiemtemperatuur dan zo gelijkmatig mogelijk en laat vooral de temperatuur 's nachts niet dalen. Zet de potten dus warm maar ook licht weg. Houd goed vochtig tijdens de kieming. De kiemtijd is dan 10-12 dagen. **Bij deze wijze van laten kiemen ziet je wel vaak een groeistilstand als de zaailingen dan van een warme omgeving naar de koude buiten/omgeving moeten. Bovendien zie je ook dan nog wel eens dat zaailingen heel dun en lang worden, soms zelfs wel omvallen. Dus het is zaak dat direct na het ontkiemen de kiemen worden afgehard (in de koude kas dus).** Het is daarom in de regel beter om ze onder koud glas/kas te laten kiemen.

*Buiten zaaien kan vanaf begin april (late herfstprei) op een zonnige, beschutte, warme en lichte plek met waterdoorlatende en vochtige grond. Zaai ongeveer ½ - 1 cm diep en bedek de zaden met een dun laagje zaaigrond. Dit kan dus ook in zaibakken/kweekpotten en heeft in de regel veel voordelen!

De direct in volle grond gezaaide planten op hun definitieve plaats moet je na een bepaalde tijd uitdunnen, waarbij je de dikste en sterkste preiplanten laat staan. De overige plantjes kun je verpotten of verplanten naar een andere plek. Het nadeel van direct zaaien in de volle grond is vaak ook dat ze te hoog gaan staan en weinig tot geen witte schacht krijgen!

Zaailingen in een zaai bak/kweekpot ga je altijd verplanten.

*Winterprei zaai je in meestal in juli. Hierbij gelden de regels als bij het zaaien in april. Winterprei kan gewoon de hele winter op het land blijven staan. Als we een ras willen telen dat tot laat in de herfst of na de winter op het land moet kunnen blijven staan, dan moet het altijd en winterprei-ras zijn.

*Na het kiemen van de zaden blijven de zaailingen nog een tijd staan op hun zaai bed. Regelmatig water geven, onkruidjes eruit vissen, etc. hoort erbij. Zit er voldoende voeding in de potgrond om de zaailingen hiermee te voeden, dan worden zo groot zijn als op de foto hieronder.



Preizaailingen in een zaai bak

Uitplanten van prei op hun definitieve plaats

*Afharderen van zaailingen die onder glas /kas hebben gestaan. Je kunt voor het afharderen ergens in de koudere volle grond een gat graven. Daar kunnen de zaailingen dan wennen aan de koudere, volle grond en daar kunnen ze met behulp van de buitengrond en de voeding die daar in zit en met regen nog best een stukje doorgroeien, soms wel tot dubbele dikte. Op de foto hieronder zie je de zaailingen in de volle grond, een flinke bos, voor het mooi iets te dicht op elkaar gezaaid.



Zaai bak met preizaailingen ingegraven in de koude grond

*De zaailingen moeten nu eindelijk bijna op potlooddikte zijn. Dan mogen ze uitgeplant worden!

*Uitplanten van de prei

En hoe je ook op dit punt wilt komen is voor iedereen een eigen keuze. Het kan dus een start zijn onder koud glas, direct voorzaaien in de volle grond zaaien, voorzaaien in tray's, voorzaaien in een bak, binnen, buiten, onder glas etc etc. Maar uiteindelijk komen we allemaal op het punt van het uitplanten. Vanaf dit punt is het vervolg allemaal hetzelfde.....het uitplanten van prei op hun definitieve plaats. Even vanuit gaande dat de methode van voorzaaien hebt aangehouden.

Zoals hiervoor al gemeld, bij direct in volle grond gezaaide planten op hun definitieve plaats moet je na een bepaalde tijd uitdunnen. Waarbij je de dikste en sterkste preiplanten laat staan. De overige plantjes kun je verpotten of verplanten naar een andere plek.

Haal met een riek de hele kluit uit de grond en zet die rechtop in een grote emmer water. Dat klinkt niet prettig voor de zaailingen, en het klinkt ook omslachtig, maar zo gaat het echt prima. Zelfs op vette klei laten de zaailingen dan gemakkelijk los van de grond en van elkaar. Op de foto hieronder zie je de zaailingen in een bak water. Houd de zaailingen vast en spoel die voorzichtig in het water tot de worteltjes allemaal vrij zijn en schoon en wit.



Zaailingen in een emmer met water

Op de volgende foto hieronder zie je zaailingen zoals er dan uitzien, mooie witte, gezonde worteltjes, alle preizaailingen los van elkaar.



Preizaailingen uitgespoeld en klaar om uit te planten

Vervolgens **knip je het bovenste deel van de prei af**. Dit bevordert de groei van het hart en blad. Dan zoek je uit al die zaailingen (die er dan uitzien als een soort mini-stengeluitjes) de dikste en gezondste zaailingen uit om uit te poten.



Geknipte zaailingen


Dan volgt het daadwerkelijk planten.

Prei plant je niet, je stopt ze in een gat!

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een afgebroken steel van een oude spade. Maak zo gaten in de grond van ongeveer 16-20 centimeter diep (de harten van de zaailingen moeten nog net boven de grond uitkomen) en ongeveer 5 centimeter breed. De gaten het liefst iets van 15 centimeter uit elkaar zodat elke prei nog breeduit kan groeien.

Steek de preizaailingen in de gaten, uiteraard 1 per gat. Niet aandrukken of dichtmaken, **maar wel gelijk even water in de openstaande gaten** met planten gieten!

Na verloop van tijd zal de prei zelf het gat vullen en door regen, etc. zal de aarde om de prei sluiten. Voor de pootstok zie je op de foto hieronder de nieuw geplante winterpreien. Je ziet dat ze slechts een klein stukje boven de grond uitsteken (hoe meer prei onder de grond, des te langer zal het – lekkerste – witte deel van de prei worden). Je ziet achter de pootstok ook nog wat preien staan, dat zijn zomerpreien die een week of 3-4 eerder zijn gezet. Je kunt zien dat het blad heel snel is aangegroeid, je kunt zelfs ook nog zien dat nog steeds niet het hele plantgat is opgevuld, het 'slibt dicht' maar dat duurt dus best een paar weken. En je kunt zien dat wel altijd een klein stukje blad boven het gat uitsteekt.



Het gaten maken en de prei poten.

Het liefst wil je waarschijnlijk dus lange witte schachten, omdat die zacht van structuur en sterk van smaak zijn. Daarom plant je zo diep mogelijk, maar wel een deel van het blad van de zaailingen dus altijd boven de grond uit.

Vervolgens kun je, als je dat wilt, dan ook nog gaan aanaarden. Je brengt dan tijdens de groei steeds meer aarde langs de schacht zodat deze zonder de invloed van licht niet meer groen kleurt maar wit blijft. Aard niet verder aan dan het punt waarop het eerste blad uit elkaar wijkt.

*De planten moeten boven een gemiddelde temperatuur van **18 °C** worden **opgekweekt**. Bij een lagere temperatuur gaan de planten over in de generatieve fase en gaan dan vroegtijdig bloeien. Prei schiet voortijdig in het zaad bij temperaturen die lager liggen dan 18 °C. Probeer dit te vermijden. Prei is een tweejarige die meestal als eenjarige wordt gekweekt.

-Verzorging na het uitplanten

Aard regelmatig aan. Houd de planten goed aan de groei door ruim te bemesten en preiplanten hebben behoefte aan veel water!

Op kleigrond zal droogte niet snel een probleem zijn. Op droge gronden, zoals zand, is regelmatig **water** geven dus wel aan te bevelen.

Regelmatig bijmesten draagt bij tot een hoge opbrengst. Prei houdt echter niet zo van onverteerde mest. Gebruik dus alleen goed verteerde stalmest óf bemest in het najaar zodat de mest alle tijd heeft om goed te verteren.

Verder kun je de prei een handje helpen door in het begin de sprietjes te ondersteunen met een stokje waaraan je een ringetje bevestigd. Hier kan de prei dan doorheen groeien en tijdens winderige dagen steun aan ondervinden.

Naast nog **onkruid** wieden hoeft er eigenlijk niet veel meer gebeuren.

-Opsomming van de mogelijke problemen

Ziekten en plagen

- De [prei mineervlieg](#) is een relatief nieuwe plaag, eigenlijk pas van de laatste 5 jaar. Je herkent hem voornamelijk aan de vele bruine poppen die in het najaar ineens in de preischachten blijken te zitten. Vaak zijn er paars/roze gekleurde vreetgangen te zien. Het gaat hier om een vliegje waarvan de larven zich in de prei vreten. De larven verpoppen in levend plantmateriaal, ruim dat dus altijd goed op in het najaar. Een insectennet is het meest effectief tegen deze plaag.
- De [preivlieg](#) lijkt wel wat op de preimineervlieg, maar de larven verpoppen in de grond, je vind ze dus niet gauw in de prei terug. De larven kunnen zich ook in de grond verplaatsen, en houden daarom van lichte, zandige grond - in vette klei komen ze niet ver. Pas gewaswisseling toe last je last hebt van de preivlieg. Actief bestrijden kan met bespuitingen met brandnetelgier. \
- De [preimot](#) is een nachtvlindertje, dat ook eitjes afzet op de prei en waarvan de larven zich in de prei vreten. De larven vreten aan het binnenste blad, terwijl ze de blad huid ongemoeid laten. Je ziet dan 'vensters' in het blad, waarin de larven zich bewegen. Later worden dat witte strepen, die kunnen gaan scheuren en het blad een rafelig uiterlijk geven. Ter bestrijding is insectengaas effectief, verder het verwijderen van het bovenste blad zodra de eerste schade zichtbaar is. De eitjes worden voornamelijk op het bovenste blad afgezet.
- De [schimmelziekte](#) roest in herkenbaar aan de kleine oranje/bruine vlekjes of strepen op het blad. Ze kan optreden in een nat najaar. Pas bij prei een ruime gewaswisseling (6 jaar) toe ter voorkoming van ziektes.

OOGST

Zorg ervoor dat je de zomer- en herfstprei voor de winter oogst vanwege de kans op schimmel.

Prei oogsten is misschien nog wel meer werk dan prei planten. De preiplanten hebben zich in de loop van het seizoen namelijk stevig vastgeklampt aan de bodem. Het oogsten van prei is dus geen kwestie van eenvoudigweg de plant uit de grond trekken.

Wat het beste werkt is een **spitvork** vlakbij de plant diep onder de grond steken. Als je vervolgens met een hand de spitvork bedient, kan je met de andere hand aan de prei trekken. De spitvork gebruik je om de grond onder en rondom de preiplant omhoog te wippen, zodat het makkelijker wordt om de plant uit de grond los te krijgen.